

# 10 | Relations binaires

Cahier de calcul :  $\emptyset$ .

Banque CCINP :  $\emptyset$ .

— **Exercice 1** ●○○○ — Soit  $E$  l'ensemble des droites du plan. Quelles sont les propriétés vérifiées par la relation de parallélisme ? d'orthogonalité ?

## Relations d'équivalence

— **Exercice 2** ●●○○ — **Construction de  $\mathbb{Z}$  à partir de  $\mathbb{N}$  et de  $\mathbb{Q}$  à partir de  $\mathbb{Z}$**

1. On définit une relation  $\sim$  sur  $\mathbb{N}^2$  en posant, pour tous  $(m, n), (m', n') \in \mathbb{N}^2$ ,

$$(m, n) \sim (m', n') \iff n + m' = n' + m.$$

- Montrer que la relation  $\sim$  est une relation d'équivalence. Ici on veillera à mener ses calculs uniquement dans  $\mathbb{N}$ .
- Pourquoi est-il naturel de définir  $\mathbb{Z}$  comme l'ensemble quotient  $\mathbb{N}^2/\sim$  ?  
(Indication : on pourra s'intéresser à l'application  $(m, n) \mapsto m - n$  de  $\mathbb{N}^2$  dans  $\mathbb{Z}$ .)

2. On définit une relation  $\sim$  sur  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$  en posant, pour tous  $(p, q), (p', q') \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ ,

$$(p, q) \sim (p', q') \iff pq' = p'q.$$

- Montrer que la relation  $\sim$  est une relation d'équivalence. Ici on veillera à mener ses calculs uniquement dans  $\mathbb{Z}$ .
- Pourquoi est-il naturel de définir  $\mathbb{Q}$  comme l'ensemble quotient  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*/\sim$  ?

— **Exercice 3** ●●○○ — **Relation de congruence**

Soit  $n$  un entier naturel non nul. On définit sur  $\mathbb{Z}$  la relation  $\equiv [n]$ , dite de congruence, en posant, pour tout  $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ ,

$$a \equiv b [n] \iff n \mid b - a \quad (\text{i.e. } n \text{ divise } b - a),$$

autrement dit,

$$a \equiv b [n] \iff \exists k \in \mathbb{Z}, \quad b - a = kn.$$

- Montrer que  $\equiv [n]$  est une relation d'équivalence.
- Expliciter les différentes classes d'équivalence et préciser le cardinal de l'ensemble quotient  $\mathbb{Z}/\equiv [n]$ .

— **Exercice 4** ●○○○ — On définit sur  $\mathbb{R}$  la relation  $\mathcal{R}$  en posant, pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,

$$x\mathcal{R}y \iff x e^y = y e^x.$$

- Montrer que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence.
- Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Déterminer le cardinal de la classe de  $x$ .

— **Exercice 5** ●○○○ — Soit  $E$  un ensemble et  $A$  un sous-ensemble de  $E$ . On définit sur  $\mathcal{P}(E)$  la relation  $\mathcal{R}$  en posant, pour toutes parties  $X$  et  $Y$  de  $E$ ,

$$X\mathcal{R}Y \iff A \cap X = A \cap Y.$$

- Montrer que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence.
- Déterminer les classes d'équivalence suivantes :  $cl(\emptyset)$ ,  $cl(E)$ ,  $cl(A)$  et  $cl(\bar{A})$ .
- Soit  $X \in \mathcal{P}(E)$ . Montrer que  $B = A \cap X$  est l'unique élément de  $cl(X)$  contenu dans  $A$ .
- Expliciter  $\mathcal{P}(E)/\mathcal{R}$  et  $\mathcal{P}(A)$  dans le cas  $E = \{1, 2, 3, 4\}$  et  $A = \{1, 2\}$ .
  - Préciser une bijection de  $\mathcal{P}(E)/\mathcal{R}$  sur  $\mathcal{P}(A)$  dans le cas particulier de la question précédente, puis dans le cas général.

— **Exercice 6** ●●○○ — Montrer que le nombre  $R_n$  des relations d'équivalence sur un ensemble fini de cardinal  $n$  vérifie la relation de récurrence :

$$R_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} R_k.$$

## Relations d'ordre

— **Exercice 7** ●○○○ — **Ordre strict** Soit  $E$  un ensemble.

Une relation binaire  $\mathcal{R}$  sur  $E$  est dite *irréflexive* lorsque :

$$\forall x \in E, \quad \text{non } (x\mathcal{R}x).$$

On appelle alors *ordre strict sur  $E$*  toute relation binaire sur  $E$  irréflexive et transitive.

- Montrer que les relations d'ordre strictes sont antisymétriques.
- Montrer que si  $\leq$  est une relation d'ordre sur  $E$ , alors l'ordre strict associé  $<$  est une relation d'ordre stricte.
- Réciproquement, si  $<$  est une relation d'ordre stricte sur  $E$ , montrer que la relation binaire  $\leq$  définie sur  $E$  par

$$\forall x, y \in E, \quad x \leq y \iff x < y \text{ ou } x = y$$

est une relation d'ordre sur  $E$ .

### Exercice 8 ●●○○ — Ordre produit et ordre lexicographique

Soit  $E$  un ensemble et  $\leq$  une relation d'ordre sur  $E$ .

1. On définit une relation  $\leq_x$  sur  $E \times E$  en posant, pour tous  $(x, y), (x', y') \in E \times E$ ,

$$(x, y) \leq_x (x', y') \iff x \leq x' \text{ et } y \leq y'.$$

a. Montrer que  $\leq_x$  est une relation d'ordre. On appelle cet ordre l'*ordre produit* sur  $E \times E$  (issu de  $\leq$ ).

b. Montrer que si  $E$  possède au moins deux éléments,  $\leq_x$  n'est pas totale.

2. On définit une relation  $\leq_{\text{lex}}$  sur  $E \times E$  en posant, pour tous  $(x, y), (x', y') \in E \times E$ ,

$$(x, y) \leq_{\text{lex}} (x', y') \iff x < x' \text{ ou } (x = x' \text{ et } y \leq y').$$

a. Montrer que  $\leq_{\text{lex}}$  est une relation d'ordre. On appelle cet ordre l'*ordre lexicographique* (pourquoi?) sur  $E \times E$  (issu de  $\leq$ ).

b. Montrer que si  $\leq$  est totale, alors  $\leq_{\text{lex}}$  l'est aussi.

3. On considère ici  $\mathbb{N}$  muni de son ordre usuel  $\leq$ .

Exprimer, pour tous  $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{N}^2$ ,  $\inf\{(x_1, y_1), (x_2, y_2)\}$  pour l'ordre produit sur  $\mathbb{N}^2$ .

4. On se place désormais dans le cas où  $E = \mathbb{R}$  et où  $\leq$  est l'ordre usuel  $\leq$ .

Pour  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , représenter graphiquement l'ensemble des majorants de  $(x, y)$  pour  $\leq_x$  et  $\leq_{\text{lex}}$ .

### Exercice 9 ●○○○ — Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On définit une relation $\leq_f$ sur $\mathbb{R}$ en posant, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ ,

$$x \leq_f y \iff f(y) - f(x) \geq |y - x|.$$

1. Montrer que  $\leq_f$  est une relation d'ordre.  
2. Montrer que  $\leq_f$  est totale si et seulement si :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, |f(y) - f(x)| \geq |y - x|.$$

3. Quelle est la relation  $\leq_{\text{Id}_{\mathbb{R}}}$  ?

### Exercice 10 ●○○○ — Soit $E$ un ensemble et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une application injective. On définit sur $E$ une relation binaire $\leq$ par :

$$x \leq y \iff f(x) \leq f(y).$$

1. Montrer que  $\leq$  est une relation d'ordre sur  $E$ .  
2. Cet ordre est-il total ?

### Exercice 11 ●○○○ — On définit sur $\mathbb{N}$ une relation $\leq$ en posant, pour tous $x, y \in \mathbb{N}$ ,

$$x \leq y \iff \exists n \in \mathbb{N}, y = x^n.$$

1. Montrer que  $\leq$  est une relation d'ordre. Cette relation est-elle totale ?  
2. Soit  $A = \{2, 4, 16\}$ . Déterminer le plus grand et le plus petit éléments de  $A$  pour cet ordre.  
3. Soit  $B = \{2, 3\}$ .  $B$  possède-t-il des majorants? des minorants? un plus grand élément? un plus petit élément ?  
4. Soit  $D = \{4, 8\}$ . Déterminer  $\sup D$  et  $\inf D$ .

### Exercice 12 ●●○○ — On travaille dans $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ muni de la relation d'inclusion $\subset$ . L'ensemble $\left\{ \left[ \frac{1}{n}, n \right] \right\}_{n \in \mathbb{N}^*}$ possède-t-il un plus grand élément? une borne supérieure ?

### Exercice 13 ●●○○ — On munit $\mathbb{N}$ de la relation $|$ de divisibilité. L'ensemble $\{2^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ possède-t-il un plus grand élément? un plus petit élément? une borne supérieure? une borne inférieure ?

### Exercice 14 ●○○○ — Énoncer et démontrer l'analogue du théorème 28 pour les bornes inférieures.

Exercice 13. Le minimum est 1 et la borne supérieure est 0.  
Exercice 12. Il y a seulement une borne supérieure égale à  $]0, +\infty[$ .  
seulement un majorant, à savoir 1. 4.  $\sup D = 64$  et  $\inf D = 2$ .  
Exercice 11. 1. L'ordre n'est pas total. 2.  $\min A = 2$  et  $\max A = 16$ . 3.  $B$  possède  
Exercice 5. 2.  $\text{cl}(\emptyset) = \emptyset$ ,  $\text{cl}(A) = A$ ,  $\text{cl}(E) = E$ ,  $\text{cl}(A) = A$  si  $A \subset X$ .  
Exercice 4.  $| \text{cl}x | = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0 \text{ ou } x = 1 \\ 2 & \text{si } 0 < x < 1 \text{ ou } 1 < x \end{cases}$ .

Exercice 1. La relation de parallélisme est une relation d'équivalence. La relation d'orthogonalité est symétrique.

#### Éléments de réponses

Exercice 4. 2. On pourra se ramener à une étude de fonction.

#### Indications