

Matrices et systèmes linéaires

Cahier de calcul : fiches 21 et 22.

Banque CCINP : \emptyset .

Opérations matricielles

Exercice 1 ••••

1. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 6 & -4 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & -3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ -3 & 2 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, E = (x \ y \ z).$$

Quels produits sont possibles ? Les calculer !

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer A^2 , B^2 , AB et BA .

Exercice 2 ••••

Calculer $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 3 ••••

Pour toute matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$, on appelle conjuguée de A la matrice

$$\overline{A} = (\overline{a_{i,j}})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

1. Montrer que, pour tous $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$, $\overline{A + B} = \overline{A} + \overline{B}$.
2. Montrer que, pour tous $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{C})$, $\overline{AB} = \overline{A}\overline{B}$.
3. Montrer que, pour tous $A \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$, $\overline{A^{-1}} = (\overline{A})^{-1}$.

Systèmes linéaires

Exercice 4 ••••

Résoudre les systèmes linéaires suivants d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ou $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

1. $\begin{cases} 2x + y = 2 \\ 3x - 5y = 1 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 2x - y + 2z = 10 \\ x + 2y - 3z = -7 \\ 5x + 4y + z = 13 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x - y = -3 \\ -6x + 3y = 9 \end{cases}$

7. $\begin{cases} 2x - y + 2z = 1 \\ -3x + 2y - z = 3 \\ -x + y + z = 4 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - 3y - 7z = 10 \\ x + 3y + 4z = 6 \end{cases}$

8. $\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 4x + y + z = 3 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2x + 5y - 3z = 1 \\ 3x + 4y + 4z = 1 \\ x - 2y + 4z = 3 \end{cases}$

9. $\begin{cases} -2x + y - z = 1 \\ x + 2y + z = 4 \\ 3x + 26y + 7z = 48 \end{cases}$

Exercice 5 ••••

Résoudre les systèmes linéaires suivants d'inconnues $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$.

1. $\begin{cases} 2x - y + 2z - 2t = 3 \\ x - 3y - z + 6t = 4 \\ -3x + y - z + 2t = -4 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3x + 3y + 2z + 3t = 5 \\ 3x - 5z = 1 \\ 7x + 5y + 5t = 9 \end{cases}$

Exercice 6 ••••

Pour quelles valeurs de $a, b, c \in \mathbb{R}$, le système linéaire

$$\begin{cases} x + y + 2z = a \\ x + z = b \\ 2x + y + 3z = c \end{cases}$$

d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ est-il compatible ?

Exercice 7 ••••

Déterminer les coefficients de l'unique polynôme P de degré 2 pour lequel

$$P(1) = 2, \quad P(2) = 1 \quad \text{et} \quad P(3) = 2.$$

Exercice 8 •••• Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$.


Déterminer les coefficients réels a, b, c, d tels que $aA^3 + bA^2 + cA + dI_3 = 0$.

Exercice 9 •••• Résoudre les systèmes linéaires suivants d'inconnues $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$.

$$1. \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + y + z = -m(x+1) \\ 3x + 3y + z = my \\ 3x + 3y + z = -mz \end{cases}$$

Exercice 10 •••• Complétez le triangle ci-dessous de manière que le nombre inscrit dans chaque case soit égal à la somme des deux nombres inscrits dans les deux cases juste au-dessous de celle-ci.



Anneau des matrices carrées

Exercice 11 •••• Montrer que, pour tous $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $p \in \mathbb{N}^*$,

$$A^p - B^p = \sum_{i=0}^{p-1} A^i(A - B)B^{p-i-1}.$$

Exercice 12

Une matrice carrée est dite *stochastique* lorsque tous ses coefficients sont positifs ou nuls et lorsque la somme des coefficients de chaque ligne est égale à 1. Montrer que le produit de deux matrices stochastiques est encore une matrice stochastique.

Exercice 13

Montrer qu'il n'existe pas de couple de matrices $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ tel que $AB - BA = I_n$.

Exercice 14

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ symétriques.

Montrer que AB est symétrique si et seulement si $AB = BA$.

Exercice 15

- Exprimer, pour tous $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\text{tr}(A^\top B)$ en fonction des coefficients des matrices A et B .
- À quelle condition nécessaire et suffisante sur A a-t-on $\text{tr}(A^\top A) = 0$?

Exercice 16 •••• Montrer que tout élément de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit de façon unique comme la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

Exercice 17

Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on note \mathcal{T}_p l'ensemble des matrices carrées $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$\forall i, j \in [1, n], \quad j < i + p \implies m_{ij} = 0.$$

- Quelle est concrètement la forme des matrices de \mathcal{T}_p , pour tout $p \in \mathbb{N}$?
- Montrer que, pour tous $p, q \in \mathbb{N}$, $A \in \mathcal{T}_p$ et $B \in \mathcal{T}_q$, on a $AB \in \mathcal{T}_{p+q}$.
- En déduire que toute matrice de \mathcal{T}_1 est nilpotente.

Exercice 18 •••• Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Résoudre en fonction de A et B l'équation matricielle $X + \text{tr}(X)A = B$, d'inconnue $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 19 •••• Déterminer les puissances des matrices suivantes.

a. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. b. $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. c. $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. d. $D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

e. $E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. f. $F = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. g. $G = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

h. $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. i. $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. j. $J = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, avec $\theta \in \mathbb{R}$.

k. $K = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{[n]}$. l. $L = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}_{[n]}$.

Exercice 20 •••• Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & -5 & 6 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}$.

- Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $x_n \in \mathbb{R}$ tel que

$$M^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2x_n & 1 - 2x_n & 2x_n \\ x_n & -x_n & x_n + 1 \end{pmatrix}.$$

- Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmético-géométrique.
- En déduire l'expression de M^n en fonction de n .

Exercice 21 •••• Calculer les puissances de la matrice $\begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}$, avec $a, b, c \in \mathbb{K}$.

Exercice 22 ••••

Les matrices suivantes sont-elles inversibles ? Le cas échéant, déterminer leur inverse.

- $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.
- $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -6 & -15 \end{pmatrix}$.
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.
- $\begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 9 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.
- $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \\ 5 & 4 & 0 \end{pmatrix}$.
- $\begin{pmatrix} 1 & \bar{z} & \bar{z}^2 \\ z & 1 & \bar{z} \\ z^2 & z & 1 \end{pmatrix}$ ($z \in \mathbb{C}$).
- $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.
- $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \\ 13 & 2 & 1 & 9 \\ 7 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{[n]}$.
- $\begin{pmatrix} 1 & 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}_{[n]}$.

Exercice 23 ••••

Pour quelles valeurs du réel a la matrice $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ est-elle inversible ?
Le cas échéant, déterminer l'inverse de A .

Exercice 24 •••• Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 6 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$.

Déterminer les réels λ pour lesquels la matrice $A - \lambda I_3$ n'est pas inversible.

Exercice 25 •••• Soit $A \in \mathrm{GL}_p(\mathbb{K})$, $B \in \mathrm{GL}_q(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Montrer que la matrice $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ est inversible et calculer son inverse sous forme d'une matrice par blocs.

Exercice 26 •••• Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $A + B = AB$.

- Montrer que $I_n - A$ et $I_n - B$ sont inversibles.
- Montrer que A et B commutent.

Exercice 27 ••••

- Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- Calculer A^2 .
- La matrice A est-elle inversible ? Le cas échéant, expliciter son inverse.

- Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

- Calculer A^3 .
- La matrice A est-elle inversible ? Le cas échéant, expliciter son inverse.

- Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

- Calculer $A^3 + 3A^2 + 3A$.
- La matrice A est-elle inversible ? Le cas échéant, expliciter son inverse.

- Résoudre l'équation $AX = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, où $X \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

- On considère les matrices suivantes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, où $n \geq 2$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad J = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

- Établir une relation entre A , J et I_n .
- Calculer J^2 .
- En déduire que A est inversible et l'expression de son inverse.

Exercice 28 ••○○ On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Résoudre, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, le système linéaire $AX = \lambda X$, d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.
2. En déduire trois matrices colonnes $X_i \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ non nulles et trois réels distincts λ_i , avec $i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$, tels que

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, \quad AX_i = \lambda_i X_i.$$

On note P la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ de colonnes X_1, X_2, X_3 .

3. Montrer que P est inversible et calculer P^{-1} .
4. Déterminer sans calcul une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $AP = PD$.
5. En déduire, pour tout $k \in \mathbb{N}$, une expression de A^k en fonction de k , P et D , puis une expression explicite de A^k en fonction de k .

Exercice 29 ••○○ Une construction matricielle de \mathbb{C}

Au chapitre 6 nous avons admis l'existence d'un corps \mathbb{C}

- contenant \mathbb{R} et un élément i vérifiant $i^2 = -1$;
- dont tout élément s'écrit de façon unique sous la forme $a + ib$, avec $a, b \in \mathbb{R}$.

L'exercice qui suit propose la construction d'un sur-corps de \mathbb{R} que nous pourrons identifier à \mathbb{C} . Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}$, on pose

$$M(a, b) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

et on note $\mathcal{C} = \{M(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}I_2 + \mathbb{R}J$, où $J = M(0, 1)$.

1. Montrer que \mathcal{C} est un sous-anneau commutatif de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Montrer que \mathcal{C} est un corps.
3. Montrer que l'application $x \mapsto xI_2$ est un morphisme injectif d'anneaux de \mathbb{R} dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
4. Conclure.
5. Dans le cadre de cette identification de \mathcal{C} avec \mathbb{C} , à quelles opérations sur les matrices la conjugaison et le module correspondent-elles ?

Exercice 30 •○○○

On note A l'ensemble des matrices de la forme $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$, a et b décrivant \mathbb{Z} .

1. Montrer que A est un anneau pour les lois d'addition et de multiplication matricielles.
2. Déterminer $U(A)$.

Exercice 31 ••○○ Soit $n \in \mathbb{Z}$.

On note A l'ensemble des matrices de la forme $\begin{pmatrix} a & nb \\ b & a \end{pmatrix}$, a et b décrivant \mathbb{Q} .

1. Montrer que A est un sous-anneau commutatif de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Montrer que A est un corps si et seulement si n n'est pas un carré parfait.

Exercice 32 ••○○ Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on note $R(\theta)$ la matrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ suivante

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que $\theta \mapsto R(\theta)$ est un morphisme de groupes de \mathbb{R} dans $GL_2(\mathbb{R})$. Déterminer son noyau.
2. En déduire le calcul des puissances de la matrice $R(\theta)$, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.

Exercice 33 ••○○ Montrer que $M \mapsto \det M$ est un morphisme surjectif de groupes de $(GL_2(\mathbb{K}), \times)$ sur (\mathbb{K}^*, \times) .

Exercice 34 •○○○ On note G l'ensemble des matrices $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, où $n \in \mathbb{Z}$.

1. Montrer que G est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{R})$.
2. À quel groupe familier G est-il isomorphe ?

Exercice 35 ••○○ Centre du groupe $GL_n(\mathbb{K})$

Déterminer le centre du groupe $GL_n(\mathbb{K})$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Indications

Exercice 13. Penser à la trace.

Exercice 21. Écrire la matrice sous la forme $X^\top X$ avec $X \in \mathcal{M}_{1,3}(\mathbb{K})$.

Éléments de réponses

Exercice 1. 1. Les produits possibles sont :

$$AB = \begin{pmatrix} -4 & 6 & 6 \\ 12 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad AC = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 60 & 4 \end{pmatrix}, \quad CA = \begin{pmatrix} 12 & 8 & -16 \\ 12 & -14 & 6 \\ 30 & -30 & 10 \end{pmatrix}, \quad AD = \begin{pmatrix} 6 \\ 22 \end{pmatrix}.$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad BC = \begin{pmatrix} 13 & 6 \\ -3 & 2 \\ 37 & -15 \end{pmatrix}, \quad BD = \begin{pmatrix} 12 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

$$EB = (2x+2z \quad x+y-2z \quad -3z), \quad EC = (8x-3y-5z \quad 2x+2y+5z).$$

$$DE = \begin{pmatrix} 5x & 5y & 5z \\ 2x & 2y & 2z \\ -x & -y & -z \end{pmatrix}, \quad ED = (5x+2y-z).$$

$$2. A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2. En procédant par blocs $\begin{pmatrix} 7 & -11 & 8 & -4 \\ -14 & -2 & -7 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 8 \\ 0 & 0 & 6 & 12 \end{pmatrix}$.

Exercice 4. 1. $(\frac{11}{13}, \frac{4}{13})$. 2. $\{(x, 2x+3) \mid x \in \mathbb{R}\}$. 3. $(5, 3, -2)$. 4. \emptyset . 5. \emptyset . 6. $(2, 0, 3)$.
7. $\{(-3z+5, -4z+9, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$. 8. $(1, -1, 0)$. 9. $\left\{ \left(-\frac{3}{5}z + \frac{2}{5}, -\frac{1}{5}z + \frac{9}{5}, z \right) \mid z \in \mathbb{R} \right\}$.

Exercice 5. 1. $\{(t+1, 2t-1, t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$. 2. $\left\{ \left(\frac{5}{3}z + \frac{1}{3}, -\frac{7}{3}z - t + \frac{4}{3}, z, t \right) \mid (z, t) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

Exercice 6. Le système est compatible ssi $c - a - b = 0$ et, le cas échéant, les solutions sont les triplets $(b - \lambda, a - b - \lambda, \lambda)$, avec $\lambda \in \mathbb{R}$.


Exercice 7. $P = X^2 - 4X + 5$.

Exercice 8. $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -9 & 3 \\ 2 & -5 & -2 \\ 1 & 3 & -3 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 7 & 0 & -6 \\ 0 & 11 & -4 \\ -2 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ et $\{(-\frac{1}{9}d, 0, -\frac{2}{9}d, d) \mid d \in \mathbb{R}\}$.

Exercice 9. 1. $\begin{cases} \{(x, y, 1-x-y) \mid x, y \in \mathbb{R}\} & \text{si } m=1 \\ \emptyset & \text{si } m=-2 \\ \left\{ \left(-\frac{m+1}{m+2}, \frac{1}{m+2}, \frac{(m+1)^2}{m+2} \right) \right\} & \text{sinon.} \end{cases}$

2. $\begin{cases} \emptyset & \text{si } m \in \{2, -1\} \\ \{(-y, y, 0) \mid y \in \mathbb{R}\} & \text{si } m=0 \\ \left\{ \left(-\frac{m}{m+1}, -\frac{3m}{(m+1)(m-2)}, \frac{3m}{(m+1)(m-2)} \right) \right\} & \text{sinon.} \end{cases}$

Exercice 15. 2. $A = 0$.



Exercice 16. $A = \frac{1}{2}(A^\top + A) + \frac{1}{2}(A^\top - A)$ avec $\frac{1}{2}(A^\top + A) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\frac{1}{2}(A^\top - A) \in \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 18. L'ensemble des solutions de l'équation $X + \text{tr}(X)A = B$, d'inconnue $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, est

$$\begin{cases} \emptyset & \text{si } \text{tr}(A) = -1 \text{ et } \text{tr}(B) \neq 0 \\ B + \mathbb{K}A & \text{si } \text{tr}(A) = -1 \text{ et } \text{tr}(B) = 0 \\ \left\{ B - \frac{\text{tr}(B)}{1 + \text{tr}(A)}A \right\} & \text{si } \text{tr}(A) = -1. \end{cases}$$

Exercice 19. a. $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 2^n - 1 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$. b. $B^n = 2^{n-1}B$, $n \geq 1$. c. $C^n = 2^{2n-1}B$, $n \geq 1$.

d. $D^{2n} = 2^n I_2$ et $D^{2n+1} = 2^n D$. e. $E^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & (-3)^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

f. $F^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^n + 1 & 3^n - 1 & 0 \\ 3^n - 1 & 3^n + 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^{n+1} \end{pmatrix}$. g. $G^n = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 2 & n & 3n \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

h. $H^n = \begin{pmatrix} 1 & n & n^2 \\ 0 & 1 & 2n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. i. $I^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix}$, $n \geq 1$.

j. $J^n = \begin{pmatrix} \cos(n\theta) & \sin(n\theta) \\ -\sin(n\theta) & \cos(n\theta) \end{pmatrix}$. k. $K^{2p} = (n-1)^{p-1} \begin{pmatrix} n-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}^{[n]}$, $p \geq 1$, et

$$K^{2p+1} = (n-1)^p K. \quad l. \quad L^p = (-1)^p I_n + \frac{(n-1)^p - (-1)^p}{n} (L + I_n).$$

Exercice 20. 2. $x_{n+1} = 3 - 2x_n$.

Exercice 21. $M = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix} = X^\top X$, où $X = (a \quad b \quad c)$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $M^n = (XX^\top)^{n-1}M = (a^2 + b^2 + c^2)^{n-1}M$.

Exercice 22. 1. $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 2. Non inversible. 3. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & -2/3 \\ 1 & -1/2 & -1/6 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

4. Non inversible. 5. $\begin{pmatrix} -10/3 & 8/3 & -1/3 \\ 25/6 & -10/3 & 2/3 \\ -11/6 & 5/3 & -1/3 \end{pmatrix}$. 7. $\frac{1}{4}A$. 8. Non inversible.

6. Inversible ssi $z \notin \mathbb{U}$, d'inverse $\frac{1}{1-|z|^2} \begin{pmatrix} 1 & -\bar{z} & 0 \\ -z & 1+|z|^2 & -\bar{z} \\ 0 & -z & 1 \end{pmatrix}$.

9. $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & 1 & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -2 \end{pmatrix}_{[n]} \quad 10. \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & \cdots & (-1)^{n+1} \\ 1 & -1 & 1 & \ddots & \vdots \\ 1 & -1 & 1 & \ddots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 1 & & & & 1 \end{pmatrix}_{[n]}$

Exercice 23. A est inversible si et seulement si $a \notin \{1, -2\}$ et le cas échéant

$$A^{-1} = \frac{1}{(a+2)(a-1)} \begin{pmatrix} a+1 & -1 & -1 \\ -1 & a+1 & -1 \\ -1 & -1 & a+1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 24. $\lambda \in \{4, 2, -3\}$.

Exercice 25. $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}.$

Exercice 27. **1.a** $A^2 = I_3$. **1.b** $A^{-1} = A$.

2.a $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ -4 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $A^3 = 0$. **2.b** A est non inversible.

3.a $A^2 = \begin{pmatrix} -3, 1, -3 \\ -8 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 9 & -4 & 6 \\ 3 & -3 & -1 \end{pmatrix}$, ainsi $A^3 + 3A^2 + 3A = -I_3$.

3.b $A^{-1} = -A^2 - 3A - 3I_3$. **3.c** L'unique solution est $X = A^{-1} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$.

4.a. $A = J - I_n$. **4.b.** $J^2 = nJ$.

4.c. $A^{-1} = \frac{1}{n-1}(A + (2-n)I_n)$, pour $n \geq 2$.

Exercice 28. **1.** L'ensemble des solutions est

$$\begin{cases} \{(x, -x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} & \text{si } \lambda = 1 \\ \{(2z, z, z) \mid z \in \mathbb{R}\} & \text{si } \lambda = 2 \\ \{(2y, y, -3y) \mid y \in \mathbb{R}\} & \text{si } \lambda = -2 \\ \{(0, 0, 0)\} & \text{sinon.} \end{cases}$$

2. $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (-2, 1, 2)$.

3. Pour $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, on a $P^{-1} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 4 & -8 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$. **4.** $D = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$.

5. $A^k = PD^kP^{-1} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 4 + 6\alpha + 2\beta & -8 + 6\alpha + 2\beta & 6\alpha - 6\beta \\ -4 + 3\alpha + \beta & 8 + 3\alpha + \beta & 3\alpha - 3\beta \\ 3\alpha - 3\beta & 3\alpha - 3\beta & 3\alpha + 9\beta \end{pmatrix}$ avec $\alpha = 2^k$ et $\beta = (-2)^k$.

Exercice 30. **2.** $U(A) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a = \pm 1 \text{ et } b \in \mathbb{Z} \right\}$.

Exercice 35. $Z(\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})) = \mathbb{K}^* I_n$.