

Cahier de calcul : fiche 23.**Banque CCINP :** exercices 20 et 46.

Divisibilité, division euclidienne, congruence

Exercice 1 ••○○ ? Résoudre dans \mathbb{Z} les équations suivantes.

1. $x - 1 \mid x + 3$.
2. $x + 2 \mid x^2 + 2$.
3. $x - 3 \mid x^3 - 3$.

Exercice 2 ••○○ ? **Critères de divisibilité**

1. Démontrer les critères de divisibilité usuels par 2, 3, 5, 9 et 10.
2. Déterminer un critère de divisibilité par 8, par 6, puis par 11.
3. a. Calculer $7 \times 11 \times 13$.
b. Déterminer si l'entier 29 310 478 561 est divisible par 7, 11 ou 13 ?

Exercice 3 ••○○ ? **Puissances modulaires**

1. Trouver le reste de la division euclidienne par 13 du nombre 100^{1000} .
2. Calculer $2000^{2000} \pmod{7}$.
3. Calculer $2^{500} \pmod{3}$.
4. Quel est le chiffre des unités de $7^{7^{7^{7^7}}}$?

Exercice 4 ••○○ Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

1. $7 \mid 3^{2n+1} + 2^{n+2}$.
2. $11 \mid 2^{6n+3} + 3^{2n+1}$.
3. $6 \mid 5n^3 + n$.
4. $8 \mid 5^n + 2 \times 3^{n-1} + 1$.

Exercice 5 ••○○

Montrer que la somme de trois cubes consécutifs est toujours divisible par 9.

Exercice 6 ••○○ **Produit d'entiers consécutifs**Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que tout produit de n entiers consécutifs est divisible par $n!$.**Exercice 7** ••○○ Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Montrer l'assertion

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad a \equiv b [n] \implies a^n \equiv b^n [n^2].$$

Exercice 8 ••○○ ?Montrer que $a^{2^n} \equiv 1 [2^{n+1}]$, pour tous $a \in \mathbb{Z}$ impair et $n \in \mathbb{N}$.**Exercice 9** ••○○ ✓

1. Montrer que $n(n+2)(7n-5)$ est divisible par 6, pour tout $n \in \mathbb{Z}$.
2. Pour quels entiers n est-il vrai que $n+1$ divise $n+7$?
3. Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{Z}$ l'entier $n^2 + (n+1)^2 + (n+3)^2$ est-il divisible par l'entier 10 ?
4. Trouver tous les nombres premiers p pour lesquels $3p+4$ est un carré parfait.
5. Pour quels entiers n le produit $n(n+2)$ est-il une puissance de 2 ?

PGCD, PPCM et entiers premiers entre eux

Exercice 10 ••○○Montrer que le pgcd de $2n+4$ et $3n+3$ ne peut être que 1, 2, 3 ou 6.**Exercice 11** ••○○ ? Soit $a, b, n \in \mathbb{Z}$.

1. Montrer que $n^3 + 3n^2 - 5$ et $n+2$ sont premiers entre eux.
2. Montrer que si $a \wedge n = 1$, alors $(ab) \wedge n = b \wedge n$.
3. Montrer que $(n^4 + 3n^2 - n + 2) \wedge (n^2 + n + 1) = (n-2) \wedge 7$.
4. Montrer que $(a+b) \wedge (a \vee b) = a \wedge b$.

Exercice 12 ••○○ On pose, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $M_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -n \end{pmatrix}$.

1. Montrer l'assertion

$$\forall a, b, q, r \in \mathbb{Z}, \quad a = bq + r \iff \begin{pmatrix} b \\ r \end{pmatrix} = M_q \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

2. En déduire une version matricielle de l'algorithme d'Euclide étendu.

3. Mettre en œuvre cette technique pour calculer $1254 \wedge 40$ et déterminer une relation de Bézout de ces deux entiers.

Exercice 13 ••○○ ?

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrer que $\frac{21n-3}{4}$ et $\frac{15n+2}{4}$ ne sont pas tous les deux entiers.

Exercice 14 •○○○ ? Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, $n+1$ et $2n+1$ sont premiers entre eux et en déduire que $n+1 \mid \binom{2n}{n}$.**Exercice 15 •○○○** ? Soit $a, b \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux.

1. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note r_k le reste de la division euclidienne de a^k par b . Pourquoi l'application $k \mapsto r_k$ n'est-elle pas injective sur \mathbb{N} ?
2. En déduire que $a^n \equiv 1[b]$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 16 •○○○ ? **Mines-Ponts MP 2022** Soit $a, b \in \mathbb{N}^*$.

Montrer que a et b sont premiers entre eux si et seulement si, pour tout entier $n \geq (a-1)(b-1)$, il existe $u, v \in \mathbb{N}$ tel que $au + bv = n$.

Exercice 17 •○○○

Montrer que, pour tous $a, b \geq 2$ premiers entre eux, $\frac{\ln a}{\ln b}$ est irrationnel.

Exercice 18 •○○○ ? **Sous-groupes de \mathbb{Z}**

1. Montrer que \mathbb{Z} est le seul sous-anneau de \mathbb{Z} .
2. On s'intéresse à présent aux sous-groupes de \mathbb{Z} .
 - a. Montrer que $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de \mathbb{Z} , pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - b. Montrer que tout sous-groupe de \mathbb{Z} est de la forme $n\mathbb{Z}$, pour un certain $n \in \mathbb{Z}$.
3. Soit $a, b \in \mathbb{Z}$.
 - a. Montrer que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de \mathbb{Z} .
 - b. Démontrer que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = (a \wedge b)\mathbb{Z}$.

Exercice 19 •○○○ ? Montrer que $\mathbb{U}_a \cap \mathbb{U}_b = \mathbb{U}_{a \wedge b}$ pour tous $a, b \in \mathbb{N}^*$.**Nombres premiers****Exercice 20 •○○○** ? **Banque d'exercices CCINP 2025 (86)**

1. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$. Prouver que si $a \wedge b = 1$ et $a \wedge c = 1$, alors $a \wedge (bc) = 1$.
 2. Soit p un nombre premier.
 - a. Prouver que, pour tout $k \in [1, p-1]$, p divise $\binom{p}{k}k!$, et en déduire que p divise $\binom{p}{k}$.
 - b. Prouver que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^p \equiv n \pmod{p}$.

Indication : procéder par récurrence.
 - c. En déduire, pour tout entier naturel n , que
- $$p \nmid n \implies n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Exercice 21 •○○○ ? Soit $p \in \mathbb{P}$ et $r \in \mathbb{N}^*$. Montrer l'assertion

$$\forall m \in \mathbb{Z}, \quad m \equiv 1[p^r] \implies m^p \equiv 1[p^{r+1}].$$

Exercice 22 •○○○ ? Soit $n \geq 2$ et N la somme de n entiers impairs consécutifs. Montrer que N n'est pas un nombre premier.**Exercice 23 •○○○** ? Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note p_n le n^e nombre premier. Montrer que, pour tout $n \geq 2$, $p_{n+1} < p_1 \dots p_n$.**Exercice 24 •○○○** ?

1. a. Montrer que tout entier naturel congru à 3 modulo 4 possède au moins un diviseur premier congru à 3 modulo 4.
- b. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 3 modulo 4.
2. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 5 modulo 6.

Exercice 25 •○○○ ? **X MP 2022**

Soit $p \geq 3$ un nombre premier et $t \in \mathbb{N}^*$. Soit p_1, \dots, p_r des nombres premiers congrus à 1 modulo p^t . On pose $a = 2p_1 \dots p_r$ et $c = a^{p^{t-1}}$.

1. Montrer que $c \equiv 2[p]$.
2. Montrer que $m = 1 + c + \dots + c^{p-1}$ et $c - 1$ sont premiers entre eux.
3. Soit q un facteur premier de m . Montrer que $q \equiv 1[p^t]$.
(*Il est recommandé d'admettre cette question qui découle naturellement des propriétés de l'ordre d'un élément dans un groupe (programme 2^e année).*)
4. En déduire qu'il existe une infinité de nombres premiers congru à 1 modulo p^t .

Exercice 26 ••○ — **Nombres de Fermat (Mines-Ponts MP 2022)**

1. On suppose qu'il existe $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $2^m + 1$ soit premier. Montrer que m est une puissance de 2.

2. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $F_n = 2^{2^n} + 1$. Montrer que, si $n \in \mathbb{N}$, alors $F_n = 2 + \prod_{k=0}^{n-1} F_k$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $F_n = 2^{2^n} + 1$ est appelé le n^e *nombre de Fermat*. Les nombres de Fermat F_0, F_1, F_2, F_3 et F_4 sont premiers et on conjecture que ce sont les seuls.

3. Si m et n sont deux éléments distincts de \mathbb{N} , montrer que $F_m \wedge F_n = 1$.
4. Retrouver le fait que l'ensemble des nombres premiers est infini.

Exercice 27 ••• — **?** **Nombres de Mersenne (Mines-Ponts MP 2022)**

Soit $p, q \geqslant 2$ des entiers.

1. Montrer que si $q^p - 1$ est premier, alors p est premier et $q = 2$.
2. Montrer que si p est premier impair et k est un diviseur de $2^p - 1$, alors $k \equiv 1 [2p]$.

(Cette question se traite plus naturellement avec le programme de seconde année)

Pour tout $p \geqslant 2$, l'entier $M_p = 2^p - 1$ est appelé le p^e *nombre de Mersenne*.

Tous ne sont pas premiers, e.g. $M_{11} = 23 \times 89$.

Le plus grand nombre de Mersenne premier actuellement connu est $2^{136\,279\,841} - 1$, dont l'écriture décimale est formée de 41 024 320 chiffres.

Exercice 28 ••○ — **?** **Oral ENS** Montrer qu'il existe un multiple de 1996 dont l'écriture décimale ne comporte que le chiffre 4.

Valuations p -adiques et décomposition primaire

Exercice 29 •○○

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Montrer que si a^2 divise b^2 , alors a divise b .

Exercice 30 •○○

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n est à la fois un carré parfait et un cube parfait, alors il est la puissance sixième d'un entier.

Exercice 31 •○○

Montrer que $(a \wedge b)^n = a^n \wedge b^n$, avec $a, b \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 32 •○○ — **?** Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, exprimer le cardinal de l'ensemble $\mathcal{D}(n)$ des diviseurs de n en fonction de ses valuations p -adiques $v_p(n)$.**Exercice 33 •○○** — **?** **Formule de Legendre**

1. Soit $p \in \mathbb{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On note, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$M_k = \{mp^k \mid m \in \mathbb{N}\} \cap \llbracket 1, n \rrbracket \quad \text{et} \quad V_k = \{m \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid v_p(m) = k\}.$$

- a. Déterminer, pour tout $k \in \mathbb{N}$, le cardinal de M_k .
- b. En déduire, pour tout $k \in \mathbb{N}$, le cardinal de V_k .
- c. En déduire la *formule de Legendre*,

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor,$$

où la somme est faussement infinie, car $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = 0$ dès que $p^k > n$.

2. Par combien de zéros l'entier $100!$ s'achève-t-il ?

3. Pour tous $a, b \in \mathbb{N}$, montrer que $\binom{a+b}{a}$ divise $\binom{2a}{a} \binom{2b}{b}$.

Exercice 34 ••○ — **?** **Oral ENS**

Soit $p \in \mathbb{P}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 1, p^n - 1 \rrbracket$. Quelle est la valuation p -adique de $\binom{p^n}{k}$?

Exercice 35 ••○ — **?**

Déterminer tous les entiers $n \in \mathbb{N}^*$ pour lesquels 2^n divise $3^n - 1$.

Exercice 36 •○○ — **?** **Mines-Ponts MP 2022**

Donner les couples (m, n) d'entiers naturels tels que $2^m - 3^n = 1$.

Exercice 37 ••○ — **?** **Théorème de Kurschak (Oral ENS)**

Pour quelles valeurs entières $n \geqslant m$ a-t-on $\sum_{i=m}^n \frac{1}{i} \in \mathbb{N}$?

Exercice 38 ••○ — **?** Déterminer l'ensemble des entiers naturels $n \geqslant 2$ tels que

$$\forall d \geqslant 2, \quad d \mid n \implies d - 1 \mid n - 1.$$

Exercice 39 ••○

1. On note A l'ensemble des rationnels $\frac{p}{2^n}$, (p, n) décrivant $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$.
 - a. Montrer que A est un sous-anneau de \mathbb{Q} .
 - b. Déterminer $\mathcal{U}(A)$.
2. Mêmes questions avec l'ensemble \mathbb{D} des décimaux.

Exercice 40 ••• ENS Lyon MP 2022

On note

$$\mathbb{Z}[i\sqrt{2}] = \left\{ a + ib\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \right\}.$$

1. Montrer que $A = \mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$ est un sous-anneau de \mathbb{C} .
2. Montrer que l'anneau A est euclidien, i.e. il existe une fonction $N : A \rightarrow \mathbb{N}$ telle que, pour tout $(a, b) \in A \times (A \setminus \{0\})$, il existe un couple $(q, r) \in A^2$ tel que $a = bq + r$ et $N(r) < N(b)$.
3. Énoncer et démontrer un théorème d'existence et d'unicité d'une décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$.

Équations diophantiennes

Exercice 41 ••○

1. Résoudre dans \mathbb{N}^2 l'équation $x \wedge y + x \vee y = x + y$.

2. Résoudre dans \mathbb{N}^2 les systèmes

a. $\begin{cases} x \wedge y = 5 \\ x \vee y = 60 \end{cases}$

b. $\begin{cases} x + y = 100 \\ x \wedge y = 10 \end{cases}$

Exercice 42 ••○ Résoudre les équations, d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{N}^2$, suivantes.

1. $x^2 - y^2 = 7$.
2. $9x^2 - y^2 = 32$.
3. $x^2 - 2y^2 = 3$ en raisonnant modulo 8.
4. $15x^2 - 7y^2 = 9$ en raisonnant modulo 3.

Exercice 43 ••○

1. Soit $a, b, n \in \mathbb{Z}$ pour lesquels $a \wedge n = 1$.

- a. Montrer que $aa' \equiv 1 [n]$ pour un certain $a' \in \mathbb{Z}$.
- b. En déduire, en fonction de a', b et n , les solutions de l'équation $ax \equiv b [n]$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$.

2. Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$,

- a. $5x \equiv 3 [28]$.
- b. $14x \equiv 6 [34]$.

3. Résoudre l'équation $ax \equiv b [n]$ d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$, pour tous $a, b, n \in \mathbb{Z}$.

Exercice 44 ••○ Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$.
On s'intéresse à l'équation $(\mathcal{E}) : ax + by = c$, d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

1. Montrer que (\mathcal{E}) n'a pas de solution si c n'est pas un multiple de $a \wedge b$.
2. On suppose à présent que $a \wedge b$ divise c .
 - a. Montrer, grâce à une relation de Bézout de a et b , que l'équation (\mathcal{E}) possède une solution (x_0, y_0) .
 - b. Résoudre (\mathcal{E}) et interpréter le résultat géométriquement.
3. Résoudre les équations, d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$,
 - a. $7x - 12y = 3$.
 - b. $20x - 53y = 3$.

Exercice 45 ••○ Résoudre le système $\begin{cases} x \equiv 1 [6] \\ x \equiv 3 [5] \end{cases}$, d'inconnue $x \in \mathbb{Z}$.**Exercice 46** ••○ Banque d'exercices CCINP 2025 (94)

1. Énoncer le théorème de Bézout dans \mathbb{Z} .
2. Soit a et b deux entiers naturels premiers entre eux, soit $c \in \mathbb{N}$. Prouver que

$$(a \mid c \text{ et } b \mid c) \iff ab \mid c.$$

3. On considère le système d'inconnue x dans \mathbb{Z}

$$(\mathcal{S}) : \begin{cases} x \equiv 6 \pmod{17} \\ x \equiv 4 \pmod{15} \end{cases}$$

- a. Déterminer une solution particulière x_0 de (\mathcal{S}) dans \mathbb{Z} .
- b. Déduire des questions précédentes la résolution dans \mathbb{Z} du système (\mathcal{S}) .

Exercice 47 ••○ Triplets pythagoriciens

1. Soit $(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$. On suppose que

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad \text{et} \quad x \wedge y = 1.$$

- a. Montrer que $y \wedge z = 1$.
- b. Montrer que x ou y est pair.

Quitte à les permuter, on suppose désormais y pair.

- c. Montrer que $y + z$ et $z - y$ sont premiers entre eux, puis qu'il existe des entiers $a, b \in \mathbb{N}^*$ impairs et premiers entre eux tels que $y + z = a^2$ et $z - y = b^2$.
- d. En déduire la forme du triplet (x, y, z) .

2. Résoudre finalement l'équation $x^2 + y^2 = z^2$ d'inconnue $(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$.

Exercice 48 Pour montrer que l'équation $y^2 = x^3 + 7$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ n'a pas de solution, on suppose par l'absurde qu'elle en possède une (x, y) .

1. Montrer que $x \equiv 1 [4]$.
2. Montrer que $x^3 + 8$ possède un facteur premier p congru à 3 modulo 4.
3. Calculer y^{p-1} modulo p de deux manières différentes, puis conclure.

Exercice 49

On veut résoudre l'équation $x^y = y^x$ d'inconnue $(x, y) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

1. Déterminer l'ensemble des solutions via une étude de fonction.
2. Pour une résolution purement arithmétique, commencer par établir que si (x, y) est un couple solution avec $x \leq y$, alors x divise y .

- Exercice 40.** 2. Considérer $N : a + ib\sqrt{2} \mapsto |a + ib\sqrt{2}|$ et commenter par considérer le quotient a/b dans \mathbb{C} . 3. On pourra s'inspirer de la preuve du théorème 56.
- Exercice 41.** Factoriser x par leur PGCD.
- Exercice 42.** 1. et 2. Factoriser. 3. Examiner les carrés modulo 8.
- Exercice 43.** 3. Procéder par analyse synthétique.
- Exercice 44.** 2.b. $\{(x_0 + kb, y_0 - ka) \mid k \in \mathbb{Z}\}$. 3.b. avec $a = (a \vee b)a$ et $b = (a \vee b)b$.
- Exercice 45.** $13 + 30\mathbb{Z}$.
- Exercice 46.** 3.a. $x_0 = -11$ ou $x_0 = 244$ convenable. 3.b. $-11 + 255\mathbb{Z}$.
- Exercice 47.** $\{(3, 4)\}, \{(2, 2), (3, 7)\}, \emptyset, \emptyset$.
- Exercice 48.** 2. Factoriser $x^3 + 8$.
- Exercice 49.** $\{(x, x) \mid x \in \mathbb{N}_*\} \cup \{(2, 4), (4, 2)\}$.

- Exercice 38.** Considérer le plus grand diviseur non trivial de n .
- Exercice 39.** 1.b. $\{\pm 2^k \mid k, l \in \mathbb{Z}\}$.
- Exercice 40.** 2. Considérer $N : a + ib\sqrt{2} \mapsto |a + ib\sqrt{2}|$ et commenter par considérer le quotient a/b dans \mathbb{C} . 3. On pourra s'inspirer de la preuve du théorème 56.
- Exercice 41.** Factoriser x par leur PGCD.
- Exercice 42.** 1. et 2. Factoriser. 3. Examiner les carrés modulo 8.
- Exercice 43.** 1.b. $a\mathbb{b} + n\mathbb{Z}$. 2.a. $23 + 28\mathbb{Z}$. 2.b. $15 + 17\mathbb{Z}$. 3. Posons $d = a \wedge n$. L'ensemble des solutions est $\begin{cases} \emptyset & \text{si } d \nmid b \\ \mathbb{Z} & \text{si } d \mid b \text{ avec } \frac{c}{d} \equiv 1 \left[\frac{n}{d} \right]. \end{cases}$
- Exercice 44.** 2.b. $\{(x_0 + kb, y_0 - ka) \mid k \in \mathbb{Z}\}$. 3.b. avec $a = (a \vee b)a$ et $b = (a \vee b)b$.
- Exercice 45.** $13 + 30\mathbb{Z}$.
- Exercice 46.** 3.a. $x_0 = -11$ ou $x_0 = 244$ convenable. 3.b. $-11 + 255\mathbb{Z}$.
- Exercice 47.** $\{(3, 4)\}, \{(2, 2), (3, 7)\}, \emptyset, \emptyset$.
- Exercice 48.** 2. Factoriser $x^3 + 8$.
- Exercice 49.** $\{(x, x) \mid x \in \mathbb{N}_*\} \cup \{(2, 4), (4, 2)\}$.